



Doseringstabel voor het gebruik van Virkon™S in (vis)vijvers

Preventief/curatief gebruik	Doelstelling	Wanneer	Dosering	Frequentie	Aantal doseringen	Voorwaarde
Preventief	Voor een constante lage bacteriedruk en continu geconditioneerd vijverwater	Jaarrond	1 gram per 1000 liter water	Wekelijks	Iedere week	Het is belangrijk dat voorafgaand aan dosering 5-10% van het watervolume wordt ververs
Preventief	Voor het verlagen van de bacteriedruk	Voorjaar/najaar	2 gram per 1000 liter water	Wekelijks	3 maal per week	Het is belangrijk dat voorafgaand aan dosering, 5-10% van het watervolume wordt ververs.
Preventief	Bij plaatsing van een (nieuwe) koi in een quarantainesysteem	Jaarrond	2 gram per 1000 liter water	Wekelijks	2 maal per week, zolang als nodig	Het is belangrijk dat voorafgaand aan dosering, 5-10% van het watervolume wordt ververs.
Preventief	Gebruik in de vijver na quarantaine-periode voor het verlagen van de bacteriedruk in de vijver. Na deze periode de koi bijzetten in de vijver	Jaarrond	2 gram per 1000 liter water	Wekelijks	1 maal per week, zolang als nodig	Het is belangrijk dat voorafgaand aan dosering, 5-10% van het watervolume wordt ververs
Curatief	Bij hardnekkige virussen en/of bacteriën	Jaarrond	5 gram per 1000 liter water	Dagelijks	Iedere dag	Op dit zuiveringsniveau is het essentieel dat voorafgaand aan dosering minstens 10% van het watervolume wordt ververs

Voor meer informatie over de aanschaf en het gebruik van Virkon™S in (vis)vijvers kunt u contact opnemen met info@biosecurity.nl